

FOLFOX6 (5-FU+ ℓ -LV+L-OHP)						
		Day				
薬剤名	用法用量	1	2	3	8	14
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m ² 点滴静注 (2時間)	↓				
レボホリナート (ℓ -LV)	200mg/m ² 点滴静注 (2時間)	↓				
フルオロウラシル (5-FU)	400mg/m ² 静注時間 (5分)	↓				
フルオロウラシル (5-FU)	2400mg/m ² 持続静注 (46時)					

【制吐対策】

- | |
|--|
| ① 5-HT受容体拮抗薬 (Day1) |
| ② デキサメタゾン静注9.9mg 1V (Day1) デキサメタゾン経口8mg (Day2~3) |

【基本事項】

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

【レジメンポイント】

- ① 前投薬の確認、オキサリプラチンは催吐性リスク中程度、デキサメタゾンは必要時
- ② オキサリプラチンの血管痛は刺入部位を保温することで軽減することがある
- ③ オキサリプラチンとレボホリナートは同時に点滴静注

【併用禁忌薬】

TS-1が投与されていないことを確認。 ※併用注意フェイトゥ、リワリン

【主な副作用】

アレルギー様症状、手足症候群、下痢、骨髄抑制、悪心や口内炎、末梢神経障害