

SOX療法 (S-1+L-OHP)						
		Day				
薬剤名	用法用量	1	8	15	21	
オキサリプラチン (L-OHP)	130mg/m ² 点滴静注 (2時間)	↓				
TS-1 (S-1)	1回40mg/m ² 1日2回 経口		→	14日間 ※1		

※1 14日間の投与であるが点滴当日帰宅後からの投与であれば15日目朝までの内服となる

【TS-1投与量】

体表面積	1回使用量
1.25m ²	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回

【制吐対策】

① 5-HT受容体拮抗薬 (Day1)
② デキサメタゾン静注6.6mg 1V (Day1) デキサメタゾン経口8mg (Day2~3)

【基本事項】

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

【レジメンポイント】

- ①前投薬の確認、オキサリプラチンは催吐性リスク中程度、デキサメタゾンは必要時
- ②オキサリプラチンの血管痛は刺入部位を保温することで軽減することがある

【併用禁忌薬】

フッ化ピリミジン系の薬剤、最低7日間あいていることを確認

※フェニトイン、ワルファリンは併用注意
イリノテカンはCYP3A4で代謝されるため併用薬注意、グレープフルーツも

【主な副作用】

アルギー用症状、下痢、骨髓抑制、悪心や口内炎、末梢神経障害、色素沈着、発疹