

CPT-11単独（4週間1コース）						
		Day				
薬剤名	用法用量	1	8	15	22	28
イリノテカン (CPT-11)	100mg/m ² 点滴静注(初回90)	↓	↓	↓		

4週間ごとPD（憎悪）まで

【制吐対策】

- ① 5-HT受容体拮抗薬（Day1、8、15）
- ② デキサメタゾン静注9.9mg 1V（Day1、8、15）
- ③ デキサメタゾン経口8mg（Day2～3、9～10、16～17）

【基本事項】

卵巣がん（上皮性卵巣がん）。前化学療法終了後6ヶ月以内の再発または前化学療法無効例（プラチナ系、タキサン系薬剤無効例）の患者。再発化学療法は予後の延長は証明されていないので、全身状態が悪い患者では症状の緩和を第一優先とする。

【レジメンポイント】

- ① 投与予定日（投与前24時間以内）の採血。下記の場合は、中止または延期。
 - ・白血球数3000/mm³未満または血小板数10万/mm³未満
 - ・白血球数3000/mm³以上かつ血小板数10万/mm³以上であっても、白血球数または血小板数が急激な減少傾向にあるなど、骨髄機能抑制が疑われる場合。

【併用禁忌薬】

CYP3A4阻害薬：骨髄機能抑制、下痢などの副作用が増強するおそれがある。患者の状態を観察しながら減量するか、または投与間隔を延長する。

CYP3A4誘導薬：活性代謝物（SN-38）血中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。本剤投与期間中は対象とする薬剤・食品との併用を避けることが望ましい。

【主な副作用】

下痢、発熱性好中球減少症、脱毛