

TC 療法 (3週間1コース)						
		Day				
薬剤名	用法用量	1	8	15	21	
PTX	175mg/m ² 点滴静注(3時間)	↓				
CBDCA AUC5	点滴静注(1時間)	↓				

3週間ごと 6コース

【前投薬】

- ①PTX投与30分前 デキサメタゾン19.8mg i.v.(2回目以降減量可)
- ②PTX投与30分前 ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg経口
- ③PTX投与30分前 ラニチジン塩酸塩50mg またはファモチジン20mg i.v

【制吐対策】

- ①5-HT₃受容体拮抗薬(Day1)
 - ②デキサメタゾン 8mg 経口 (Day2,3)
- ※Day1はPTX前投薬で代替
 ※PTX単独投与時は、PTX翌日以降のデキサメタゾン投与は原則不要

【基本事項】

stage II～IVの卵巣がん、卵管がん、腹膜がん

【レジメンポイント】

- ①前投薬の確認：制吐薬・重篤な過敏症の発現防止
- ②(相互作用) CBDCA：アミノ配糖体抗生物質、バンコマイシンなどの腎排泄の抗生物質との併用で腎障害リスク増大。

【服薬指導のポイント】

* PTXは30mgあたり約2.5mlの無水エタノールを含有(120mgでビール約180ml相当)しているので、投与前にアルコール摂取が可能かどうかを確認するとともに、投与当日の車の運転を避けるように指導する。

【主な副作用】

末梢神経毒性、アレギー症状、脱毛、アルコール*