

weekly paclitaxel 療法 (4週間1コース)					
		Day			
薬剤名	用法用量	1	8	15	28
PTX	80mg/m ² 点滴静注(1時間)	↓	↓	↓	
4週間ごと PD (憎悪) まで					

【前投薬】

- ①PTX投与30分前 デキサメタゾン16.5mg div
- ②PTX投与30分前 ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg経口
- ③PTX投与30分前 ラニチジン塩酸塩50mg またはファモチジン20mg i.v

【制吐対策】

※PTX単独投与時は、PTX翌日以降のデキサメタゾン投与は原則不要

【基本事項】

stage II～IV

子宮頸癌、卵巣癌、腹膜癌、卵管癌、子宮体癌

【レジメンポイント】

- ①前投薬の確認：制吐薬・重篤な過敏症の発現防止
- ②(相互作用) PTX：CYP2C8,CYP3A4を阻害する薬剤でPTXの血中濃度が上昇することある

【服薬指導のポイント】

* PTXは30mgあたり約2.5mlの無水エタノールを含有(120mgでビール約180ml相当)しているので、投与前にアルコール摂取が可能かどうかを確認するとともに、投与当日の車の運転を避けるように指導する。

【主な副作用】

末梢神経毒性 アルギン-症状 脱毛、アルコール*