

### CHASE療法 (CPA+Ara-C+VP-16)

		Day			
薬剤名	用法用量	1	2	3	21
エンドキサン (BV)	1200mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 (3時間)	↓			
キロサイド (Ara-C)	2000mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 (3時間)		↓	↓	
エトポシド (VP-16)	100mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 (2時間)	↓	↓	↓	

#### 【CPA：肝・腎機能低下症例に対する減量の目安】

T-Bil 3.1~5.0mg/dL or AST > 3×ULN	T-Bil > 5.0mg/dL
25%減量	中止

GFR (mL/min)	10 >
	25%減量

#### 【VP-16：肝・腎機能低下症例に対する減量の目安】

T-Bil 1.5~3.0mg/dL or AST 60~180IU/L	T-Bil > 3.0mg/dL or AST > 180IU/L
50%減量	中止

#### 【Ara-C：肝・腎機能低下症例に対する減量の目安】

Ccr(mL/min)	45~60	30~45	30 >
	40%減量	50%減量	中止

#### 【制吐対策】

① 5-HT <sub>3</sub> 受容体拮抗薬 (Day1~3)
② デキサメタゾン 静注6.6mg 5V (Day1~3)

#### 【レジメンポイント】

CPAはペントスタチンを投与中の患者には禁忌

#### 【主な副作用】

間質性肺炎、滑膜炎・角膜炎、中枢神経障害、シトラビン症候群、口内炎、脱毛、イレウス、出血性膀胱炎