

BD療法 (Bortezomib+Dexamethasone) 維持療法						
		Day				
薬剤名	用法用量	1	8	15	22	35
ベルケイド (Bortezomib)	1.3mg/m ² 皮下投与	↓	↓	↓	↓	
レナデックス (Dexamethasone)	20mg ※1 内服	↓	↓	↓	↓	

※1 当日と翌日も内服あり。

BD療法 (Bortezomib+Dexamethasone) 寛解導入療法						
		Day				
薬剤名	用法用量	1	4	8	11	21
ベルケイド (Bortezomib)	1.3mg/m ² 皮下投与	↓	↓	↓	↓	
レナデックス (Dexamethasone)	20mg ※1 内服	↓	↓	↓	↓	

※1 当日と翌日も内服あり

【適応】

多発性骨髄腫

【レジメンポイント】

①投与量の確認

Grade3以上の非血液毒性（末梢性ニューロパシー・神経傷害性疼痛を除く）またはGrade4の血液毒性に該当する副作用が発現した場合は、回復するまで休薬する。投与を再開する場合には、以下を目安に減量

副作用発現時の投与量	減量の目安
1.3mg/m ²	1.0mg/m ²
1.0mg/m ²	0.7mg/m ²
0.7mg/m ²	投与中止

②末梢性ニューロパシーまたは神経障害性疼痛に対する用法・用量の目安

投与時期	投与開始からの投与速度
疼痛または機能消失を伴わないGrade1 (症状がない:深部腱反射の低下または知覚異常)	なし
疼痛を伴うGrade1またはGrade2 (中等度の症状:身の回り以外の日常生活動作の制限)	1段階減量 (1.3mg/m ² の場合は1.0mg/m ² へ)
疼痛を伴うGrade2またはGrade3 (高度の症状:身の回りの日常生活動作の制限)	回復するまで休薬、 回復した場合は0.7mg/m ² へ
Grade4 (生命を脅かす:緊急処置を要する)	投与中止

【相互作用】

CYP3A4誘導薬（リファンピシンなど）との併用により、の代謝が促進されAUCが低下する可能性がある

【主な副作用】

肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、低血圧、高尿酸血症、発熱、B型肝炎ウイルスの再活性化