


| FOLFOX療法 | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|---|----|
| | | Day | | | |
| 薬剤名 | 用法用量 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| オキサリプラチン (L-OHP) | 85mg/m ² 点滴静注 (2時間) | ↓ | | | |
| レボホリナート (I-LV) | 200mg/m ² 点滴静注 (2時間) | ↓ | | | |
| フルオロウラシル (5-FU) | 400mg/m ² 急速静注 (5分) | ↓ | | | |
| フルオロウラシル (5-FU) | 2400mg/m ² ※1 持続静注 (46時 |  | | | |
| | | 46時間 | | | |

※1 放射線併用の場合は1600mg/m²

【制吐対策】

| |
|--|
| ① 5-HT ₃ 受容体拮抗薬 (Day1) |
| ② デキサメタゾン静注9.9mg iv (Day1) デキサメタゾン経口8mg (Day2~3) |

【適応】

咽頭がん

【レジメンポイント】

- ① 前投薬の確認、オキサリプラチンは催吐性リスク中程度、デキサメタゾンは必要時
- ② オキサリプラチンの血管痛は刺入部位を保温することで軽減することがある

【併用禁忌薬】

TS-1が投与されていないこと、および投与中止後7日以上経過していることを確認

※併用注意：ワーファリン、フェニトイン

【主な副作用】

手足症候群、下痢、骨髄抑制、悪心や口内炎、末梢神経障害